



Antibiotikawirksamkeit
sensibel

Station(en):
Alle Stationen
Fachbereich(e):
Alle Fachbereiche

Auswertungszeitraum:
01.01.2011 bis 31.12.2011
Seite 1 - Teil 1
Material: Wundmaterialien

() = Anzahl Testungen
nur ein Erregernachweis pro Patient, im gleichen Material, Strategie: zeitlicher Verlauf

Erreger-Gruppe / Antibiotika	Anteil	Häufigkeit	Ampi. + Sulbactam	Piperacillin + Tazobactam	Cefuroxim	Cefotaxim	Ceftazidim	Meropenem	Clindamycin	Tetracyclin	Ciprofloxacin	Vancomycin
Gesamt	91%	24526	80% (20634)	84% (8769)	68% (9482)	89% (5622)	91% (7695)	96% (4925)	68% (15116)	71% (20625)	82% (19240)	100% (14881)
Acinetobacter sp.	1%	221	60% (213)	87% (213)	17% (213)	52% (213)	87% (211)	84% (96)	-	83% (213)	85% (213)	-
Corynebakterien	0%	122	84% (113)	100% (2)	100% (1)	-	-	-	31% (110)	88% (111)	50% (109)	100% (111)
Enterobacter/Citrobacter/Serratia	4%	1040	12% (1014)	91% (1011)	46% (1012)	92% (1011)	91% (1010)	100% (473)	100% (3)	86% (1012)	97% (1014)	100% (2)
Enterococcus faecalis/sp.	7%	1982	99% (1899)	100% (3)	0% (605)	0% (61)	0% (79)	0% (2)	0% (1900)	22% (1888)	78% (1286)	100% (1900)
Enterococcus faecium	1%	232	2% (221)	0% (1)	0% (77)	0% (8)	0% (10)	0% (8)	0% (220)	55% (220)	11% (127)	98% (221)
Escherichia coli	8%	2022	76% (1972)	96% (1973)	97% (1974)	100% (1973)	100% (1971)	100% (1009)	50% (2)	69% (1974)	87% (1971)	100% (1)
Escherichia coli ESBL/AmpC	1%	197	0% (192)	3% (192)	1% (192)	2% (192)	3% (192)	100% (147)	-	40% (192)	42% (192)	-
Gramnegative Anaerobier	3%	674	0% (1)	-	-	-	-	-	-	100% (1)	100% (1)	-
Grampositive Anaerobier	1%	265	100% (17)	100% (3)	100% (2)	100% (1)	100% (1)	-	93% (15)	87% (15)	78% (9)	100% (13)
Haemophilus influenzae	1%	177	99% (174)	-	-	-	-	-	0% (174)	77% (173)	100% (173)	-
Hämols. Streptokokken	7%	2004	100% (1944)	-	100% (5)	100% (1)	3% (30)	98% (51)	88% (1940)	34% (1929)	100% (7)	100% (1942)
Klebsiella pneumoniae ESBL/AmpC	0%	73	2% (61)	2% (61)	2% (61)	2% (61)	2% (61)	100% (53)	-	56% (61)	39% (61)	-
Klebsiella sp.	3%	723	76% (708)	95% (708)	95% (707)	99% (708)	99% (707)	100% (343)	-	90% (708)	97% (708)	-
KNS (Koag.-neg. Staphylokokken)	8%	2211	64% (1991)	49% (1098)	50% (1116)	42% (12)	10% (10)	50% (14)	62% (1987)	83% (1985)	76% (1987)	100% (1985)
Moraxella catarrhalis	0%	57	98% (56)	-	-	-	-	-	0% (56)	98% (56)	100% (56)	-
Proteus/Morganella/Providencia	5%	1319	80% (1265)	97% (1266)	76% (1265)	98% (1265)	98% (1266)	100% (509)	-	5% (1266)	95% (1266)	-
Pseudomonas aeruginosa	7%	2008	0% (6)	100% (7)	0% (7)	0% (5)	98% (1923)	96% (1923)	-	0% (5)	90% (1923)	-
Salmonella sp.	0%	4	33% (3)	100% (3)	0% (3)	100% (3)	100% (3)	100% (2)	-	67% (3)	67% (3)	-
Sonst. Gramnegative	1%	179	13% (38)	93% (43)	56% (41)	72% (39)	97% (107)	58% (158)	-	55% (99)	88% (104)	-
Sonstige ESBL/AmpC	0%	35	0% (33)	6% (33)	0% (33)	0% (33)	3% (33)	100% (28)	-	50% (32)	79% (33)	-
Staph. aureus	26%	7119	100% (6981)	100% (1832)	100% (1837)	100% (18)	0% (41)	100% (67)	90% (6980)	97% (6961)	89% (6975)	100% (6978)
Staph. aureus (MRSA)	4%	1116	0% (1013)	0% (318)	0% (318)	0% (14)	0% (25)	0% (23)	38% (1013)	91% (1008)	8% (1013)	100% (1013)
Strept. pneumoniae	1%	166	100% (164)	-	-	100% (1)	-	-	96% (164)	97% (164)	-	100% (164)
Vergr. Streptokokken	2%	565	100% (540)	-	100% (3)	100% (1)	8% (12)	100% (17)	82% (539)	67% (534)	100% (2)	100% (538)
VRE (E. faecium/faecalis)	0%	13	8% (13)	-	0% (8)	-	0% (1)	-	0% (13)	46% (13)	0% (5)	0% (13)
Yersinia enterocolitica	0%	2	0% (2)	100% (2)	0% (2)	100% (2)	100% (2)	100% (2)	-	50% (2)	100% (2)	-
Sonstige Keime	9%	2340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-